



ચણા બિયારણ



ચણા પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

જમીન અને આબોહવા:

- સારી ભેજ સંગ્રહ શક્તિ ધરાવતી, કાળી અથવા મધ્યમ કાળી કાંપવાળી જમીનમાં ચણા ખૂબજ સારા થાય છે. આમ છતાં ગોરાડુ અને રેતાળ જમીનમાં પણ આ પાક વાવી શકાય છે. જ્યાં ખારા ભૂગર્ભજળનું સ્તર બહુ ઊંચું ન હોય અને જમીન ખારી ન હોય ત્યાં ચણા સારા થાય છે. ચણા એ ઠંડી અને સૂકી પરિસ્થિતિમાં થતો પાક છે, જે પાણીની ખેંચ અને ઓછી માવજત સામે પણ ટકી શકે છે. દિવસની લંબાઈ અને ઉષ્ણતામાનની સ્થિતિ પરથી આ પાકની અવધિ નક્કી થાય છે. જેની ઉત્પાદન પર પ્રબળ અસર પડે છે. ગુજરાત જેવા પ્રદેશો કે જ્યાં ઠંડીનું પ્રમાણ અને ઠંડીના દિવસો ઓછા છે, ત્યાં સાડા ત્રણ થી ચાર મહિનામાં પાકી જતો આ પાક ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ અને હરિયાણા જેવાં રાજ્યોમાં વધારે સમય લે છે. પાક ઉત્પાદનનો આધાર પાકવાના દિવસો પર અવલંબે છે. સૂકી અને ઠંડી આબોહવામાં થતા ચણા હિમ સહન કરી શકતા નથી. વાવણી વખતે ૨૫૦ થી ૩૦૦ સેન્ટીગ્રેડ ઉષ્ણતામાન અનુકુળ છે. જો માવઠું કે વાદળવાળું હવામાન હોય તો નુકશાન થાય છે. મોસમ દરમિયાન પુરતી ઠંડી ન પડે કે ગરમી વધી જાય તો ઉત્પાદન પર અવળી અસર પડે છે.

જમીનની તૈયારી :

- જમીનમાં જરૂરીયાત મુજબ ખેડ કરી અને સમાર મારી જમીન તૈયાર કરવી.

જાતોની પસંદગી :

- ચણાની જાતો: ગુજરાત જૂનાગઢ ચણા – ૩, ગુજરાત ચણા – ૫, ડેકોરા - પ્રાઈમ

Decora
Agri Genetics

અ.નં.	ગુણધર્મો				
			જીજેજી-૩	જીજી-૫	ડેકોરા - પ્રાઈમ
૧	બહાર પાડ્યાનું વર્ષ		૨૦૦૮	૨૦૧૪	૨૦૨૩
૨	જાતનો પ્રકાર		બિનપિયત	પિયત	પિયત અને બિનપિયત
૩	પાકવાના દિવસો		૯૮ થી ૧૦૦	૧૦૦ થી ૧૦૩	૯૩ થી ૧૧૭
૪	છોડની ઉંચાઈ (સે.મી.)		૩૫ થી ૪૦	૪૮ થી ૫૨	૪૦ થી ૮૦
૫	પોપટાની સંખ્યા		૩૫ થી ૪૦	૫૦ થી ૬૫	૧૭ થી ૭૦
૬	૧૦૦ દાણાનું વજન (ગ્રામ)		૨૨ થી ૨૪	૨૦ થી ૨૨	૪૦.૭ થી ૪૯.૯
૭	દાણાનો રંગ		પીળો	કથ્થાઈ	સફેદ
૮	ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા./હે.)	પિયત	-	૨૫૦૦ થી ૨૭૦૦	૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦
		બિનપિયત	૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦	-	૧૨૦૦ થી ૧૪૦૦

બિયારણનો દર :

- જીજેજી-૩, જીજી-૫ ચણા : ૬૦ - ૭૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર, ડેકોરા પ્રાઈમ : ૧૦૦ - ૧૨૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર.

બીજ માવજત :

- ભલામણ મુજબની દવાનો બીજને પટ આપવો. બીયારણને પટ આપવાનો હોય તો પ્રથમ ફુગનાશક દવાનો પટ આપવો પછી જંતુનાશક દવાનો પટ આપવો અને છેલ્લે ૨ કલાક બાદ રાઈઝોબીયમ કલ્ચરનો પટ આપવો.

Agri Genetics

વાવણીનો સમય :

- પિયત : ૧૫ ઓક્ટોબર થી ૧૫ નવેમ્બર સુધી, બિનપિયત : ઓક્ટોબરના છેલ્લા અઠવાડિયાથી

વાવેતર અંતર :

- પિયત : ૪૫ X ૧૦ સે.મી., બિનપિયત : ૩૦ X ૧૦ સે.મી

Decora
Agri Genetics

ખાતર વ્યવસ્થાપન :

- જમીન તૈયાર કરતી વખતે હેક્ટરે ૮ થી ૧૦ ટન સાડ કોહવાયેલું છાણીયું ખાતર આપવું. જ્યારે રસાયણિક ખાતરમાં પાયાના ખાતર તરીકે હેક્ટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવું. જો સલ્ફરની ઉણપ હોય તો ભલામણ મુજબ સલ્ફર પાયાના ખાતર તરીકે આપવું.

આંતરખેડ અને નિંદામણ:

- ચણાના પાકને જરૂરીયાત મુજબ ૨ થી ૩ વખત હાથથી નિંદામણ અને આંતરખેડ કરવી. જો ખેતમજૂરોની અછત હોય તો રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે વાવેતર બાદ તુરત એટલે કે ચણા ઉગતા પહેલાં ભલામણ મુજબની રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ કરી નિંદામણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

પિયત વ્યવસ્થાપન :

- ઘેડ અને ભાલ ઉપરાંત ચરોતરની કચારીની જમીનમાં ચોમાસા બાદ જે ભેજ સંગ્રહાયેલો હોય છે, તેનો ઉપયોગ કરીને જ બિનપિયત ચણા લેવામાં આવે છે. જ્યારે પિયત ચણામાં પ્રથમ પિયત વાવેતર બાદ તુરંત અને બીજું પિયત ૬ થી ૭ દિવસે આપ્યા બાદ પાકની કટોકટીની અવસ્થાઓ જેવી કે ડાળીઓ ફુટવી, ફૂલ આવવા, પોપટા આવવા અને દાણા ભરાતી વખતે જરૂરીયાત મુજબ જમીનના પ્રકાર મુજબ આપી શકાય.

Decora
Agri Genetics

પાક સંરક્ષણ :

ચણામાં આવતા રોગો અને તેનું નિયંત્રણ

ક્રમ	રોગનું નામ	નિયંત્રણ
૧	ચણાનો સૂકારો (વીલ્ટ)	રોગ આવતો અટકાવવા માટે રોગ પ્રતિકારક જાતો જેવી કે ગુજરાત ચણા-૫ જેવી જાતોનું બિયારણ વાવવું. વાવતા પહેલા કુગનાશક દવાનો પટ આપવો. દર વખતે એક જ જગ્યાએ ચણા ન વાવવા. જૈવિક નિયંત્રણ માટે ટ્રાઇકોડર્મા હારજીયાનમને એરંડીનો ખોળ અથવા છાણીયા ખાતરમાં ભેળવી વાવેતર વખતે ચાસમાં આપવાથી રોગ આવતો અટકે છે
૨	ચણાનો સ્ટન્ટ	સ્ટન્ટ વાયરસથી થતો અને મોલોમશીથી ફેલાતો રોગ છે. મોલોમશીના નિયંત્રણ માટે ભલામણ મુજબની શોષક પ્રકારની રાસાયણિક દવા છાંટવાથી સ્ટન્ટ રોગ ફેલાતો અટકે છે.

3	મૂળનો કોહવારો	પાકની વાવણી કરતાં પહેલાં દિવેલીનો ખોળ ૧૦૦૦ કિલો પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે જમીનમાં આપવો. યણાની સુધારેલી જાતો જેવી કે ગુજરાત જૂનાગઢ યણા-૩, ગુજરાત યણા- ૫ નું વાવેતર કરવું. યણાના બીજને ભલામણ મુજબની રાસયાનીક દવાની બીજ માવજત આપીને વાવેતર કરવું, તેમજ પાકની ફેરબદલી કરવી. ઠંડીની શરૂઆત થાય પછી જ વાવેતર કરવું હિતાવત છે
---	---------------	---

ચણામાં આવતી જીવાત અને તેનું નિયંત્રણ

ક્રમ	જીવાતનું નામ	નિયંત્રણ
૧	ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાત	ચણાના પાકમાં મુખ્યત્વે થ્રિપ્સ, તડતડીયાં અને મોલોમશી જેવી ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતોનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જીવાતોના નિયંત્રણ માટે શરૂઆતમાં ઉપદ્રવ ઓછો હોય ત્યારે ભલામણ પ્રમાણે લીંબોળીના બીજનો અર્ક અથવા લીબોળીનું તેલ પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો ભલામણ મુજબની શોષક પ્રકારની કીટનાશક છંટકાવ કરવાથી અસરકારક નિયંત્રણ થઈ શકે છે.
૨	પોપટા કોરી ખાનાર લીલી ઈયળ	ચણામાં મુખ્યત્વે લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જે પાન, કૂણી કૂપણો અને પોપટા કોરી ખાય છે. જેના અસરકારક અને અર્થક્ષમ નિયંત્રણ માટે ભલામણ મુજબની રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ કરવો. પ્રથમ છંટકાવ પાકની ૫૦ ટકા ફુલ અવસ્થાએ અને બીજો છંટકાવ પ્રથમ છંટકાવના ૧૫ દિવસ બાદ કરવો. આ ઉપરાંત હેક્ટરે ૬ ફેરોમોન ટ્રેપ મુકવાથી પણ આ જીવાતનું અસરકારક નિયંત્રણ થાય છે. તેમજ વારા ફરતી લીંબોળીના મીજના પાવડરનો અર્ક, બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ અથવા હેક્ટરે એન.પી.વી. ના દ્વાવણનો છંટકાવ કરવાથી પણ આ જીવાતનું અસરકારક નિયંત્રણ થાય છે.

કાપણી :

- પરીપકવતા સમયે ચણાના પોપટા પીળા પડી જાય છે અને પાંદડી સુકાય જાય છે. આ વખતે ચણાની કાપણી શક્ય હોય તો સવારના સમયે કરવી. કાપણી કરેલ પાથરા ખળામાં સુકવવા. પાથરા બરાબર સુકાય જાય ત્યારે ટ્રેક્ટર કે બળદથી મસળવા અથવા શ્રેશરથી દાણા છુટા પાડવા.

Decora
Agri Genetics



Decora

Agri Genetics

DECORA AGRI GENETICS

Plot No.4, Survey No.252/P1, Khodiyar Plot, Junagadh-Dhoraji Highway, At. : Makhiyala,

Ta. & Dist. : Junagadh. (Guj.) India-362011 ☎ + 91 9904871037

✉ decoraagrigenetics@gmail.com 🌐 www.decoraagrigenetics.com